

Cortinarius fulvoincarnatus Reumaux & Ramm.

Habitat :

Quelques individus récoltés le 28 septembre 2010 à Baume-les Dames, entre les lotissements du Bois Carré et la carrière Climent, dans une haie en pente, bordant d'anciennes pâtures abandonnées, largement mangées par des pruneliers, sur sol calcaire envahi de lierres sous feuillus divers.



Photo du 28/09/10 Baume-les-dames



Photo du 13/10/08 Voillans

Chapeau :

35-90 mm. D'abord en boule dans l'extrême jeunesse puis convexe, de plus en plus étalé puis finalement pratiquement plan ou à peine un peu déprimé. Surface mollement irrégulière à la fin. Marge onduleuse, d'abord enveloppante puis, à la fin, pratiquement droite. Revêtement visqueux, d'un bel ocre rosé à orangé, un peu plus pâle vers la marge et un peu plus soutenu au centre, plus uni quand la viscosité est asséchée, peigné de fibrilles concolores, assez discrètes et, donc surtout visibles à la loupe. Sans restes vélaires.

Lames :

Jusqu'à 7-8 mm, peu serrées, émarginées, d'abord d'un délicat bleu mauve pâle puis brunies par les spores. Arête concolores, onduleuses et finalement déchirée par endroits.

Stipe :

40-65 x 10-15 mm avec un gros bulbe marginé (jusqu'à 26 mm), en général bien droit, un peu évasé sous les lames puis régulier jusqu'au bulbe. Blanchâtre à ocracé pâle, brun ocracé sur le rebord du bulbe mélangé à une nette couleur violacé entre le rebord et l'amorce du reste du stipe, cette couleur peut parfois être discrète, presque évanouie. Fibrilleux. Reste de voile vite discret réduit à quelques filaments surtout important dans le bas du stipe avant le bulbe.

Chair :

Blanchâtre à ocracé pâle, sans odeur notable et saveur un peu amarescente, pas agréable du tout (à noter que la viscosité est aussi un peu amère).

Réactions :

Soude : rouge violacé sur le chapeau et plus rouge franc quoique lavé de mauve dans la chair et d'un rouge éclatant sur le bulbe.

Gayac : inerte après plusieurs dizaines de minutes, puis vaguement bleu vert.

Ammoniaque : contrairement à la soude, ne donne pas de réaction particulière.

TL4 : pratiquement inerte.


Phénol : inerte longtemps puis, à la longue, brunâtre sur la chair et brun foncé sur le chapeau

Microscopie :

Spores (A) : (9,2) 10,1 - 11,7 (12,8) x (5,6) 5,8 - 6,5 (6,8) μm ; Q = (1,6) 1,7 - 1,9 ; N = 90 ; 80 % ; Me = 10,9 x 6,1 μm ; Qe = 1,8 ; limoniformes à sommet souvent un peu papillé, à ornementation lourdes, irrégulière, déformant le profil.

Basides et articles stériles (B) : basides de 30-36 x 8-9 μm ; cylindriques épaissies au sommet à quatre stérigmates. Article stériles en bâtonnet.

Articles du suprapellis (C) : de 2-3,5 μm de larges, bouclés, flexueux et emmêlés.



Discussion :

Deux espèces très semblables se distinguent, semble-t-il, par une différence de réaction à la soude ; *fulvoincarnatus* réagit en rouge sur le chapeau, alors qu'*arcuatorum* est inerte. Dans ce sens, ce champignon serait *fulvoincarnatus*. Mais, les spores des deux espèces sont de forme bien différente, plutôt amygdaliforme pour *fulvoincarnatus* et plutôt limoniforme pour *arcuatorum*. Dans ce cas, on serait en présence d'*arcuatorum*. Privilégiant la réaction sodique, ce champignon est nommé, pour l'instant, *fulvoincarnatus*.